

MEGALON BLOC

Rodenticide prêt à l'emploi en blocs
hydrofuges à base de bromadiolone



INDIA

Conscious Care.

Composition :

Bromadiolone pure	: 0.005 %
Dénatonium Benzoate	: 0.001 %
Substances d'appétence et coformulants	: jusqu'à 100 %

Formulation :

Dans le MEGALON BLOCS la matière active bromadiolone est formulée en blocs hydrofuges (avec un poids d'environ 20 grammes) obtenus mélangeant des farines, du sucre, des huiles végétales, des protéines, des graines de céréales, des conservateurs et de la paraffine. La présence de la paraffine rend le produit résistant à l'humidité et au contact temporaire avec l'eau. Le produit, par conséquent, est particulièrement indiqué pour l'emploi dans des domaines où les autres types d'appâts rodenticides peuvent moisir et perdre leurs efficacité rapidement : sous-sols, locaux fréquemment lavés, fosses septiques, canalisations etc.

Le dénatonium benzoate est ajouté à la formulation pour rendre le produit extrêmement amer et donc éviter l'ingestion de la part des enfants ; la concentration du dénatonium benzoate dans le produit, par contre, est telle que sa présence n'est pas perçue par les rongeurs ciblés.

Les blocs sont perforés et ça permet de les accrocher dans les postes d'appâtage ; les bords des blocs sont gravés pour faciliter la morsure des rongeurs.

Espèces qui peuvent être contrôlées :

MEGALON BLOCS est accepté par tous les rongeurs nuisibles normalement présents dans nos environnements : le rat gris (*Rattus norvegicus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le souris (*Mus musculus*).

Caractéristiques :

Le bromadiolone appartient au groupe des anticoagulants indirects de deuxième génération et il est marqué par une toxicité assez élevée vers les rongeurs.

Il est efficace quelle que soit la durée de la consommation des appâts. Selon la littérature,

entre le 90 % et le 100 % des rats nourris pendant 1, 2 ou 4 jours avec des appâts contenant 0.005 % de bromadiolone, meurent. En plus, ils meurent quelle que soit la quantité de bromadiolone ingérée.

Une autre caractéristique du bromadiolone c'est que normalement il est bien accepté par le palais des rongeurs.

Taux et indications d'emploi :

Ne pas manipuler le produit aux mains nues. Porter des gants adéquats. Placer les appâts dans des postes d'appâtage de sécurité pour protéger les appâts, pour éviter que les animaux non ciblés les avalent et pour éviter la libération des appâts dans l'environnement. Placer les postes d'appâtage tout près des repaires, le long des pistes et là où on a observé la présence de rongeurs. Les postes d'appâtage doivent être placés à 5-10 mètre de distance entre eux.

Les taux d'emploi recommandés sont : Souris : 2 appâts tous les 100 m² / Rat gris: 3-5 appâts tous les 100 m² / Rat noir: 3-5 appâts tous les 100 m²

Il faut signaler la zone traitée et prévenir sur le risque d'empoisonnement et les mesures de premier secours. Remplacer les postes d'appâtage chaque semaine, si nécessaire. Enlever les rongeurs morts tous les jours et les éliminer selon les normes en vigueur. Le produit n'est pas destiné à l'appâtage permanent. Organiser des traitements de la durée de 6 semaines maximum. A la fin du traitement, éliminer les postes d'appâtage selon les normes en vigueur.

Précautions d'emploi :

Les postes d'appâtage doivent être placés en sécurité afin de réduire au maximum le risque d'intrusion et l'ingestion accidentelle de la part des enfants et des animaux non ciblés. S'assurer que les postes d'appâtage soient correctement accrochés et que les appâts ne puissent pas être trainés par les rongeurs.

Pour l'utilisation correcte de ce produit, suivre les indications sur l'étiquette. Lire et garder la FDS. Ne pas contaminer les personnes, les animaux, les denrées alimentaires, y compris celles pour animaux, les boissons et leurs récipients avec le produit.

Antidote : Vitamine K1